

APRETUDE

Cabotegravir 200 mg/ml

**(PrEP INYECTABLE
DE LIBERACIÓN
PROLONGADA)**



Howard Brown
Health

¿COMO SE ADMINISTRA EL APRETUDE?

La inyección es administrada por un proveedor de salud. La inyección se administra en el músculo de los glúteos. Las primeras dos inyecciones iniciales se administran con un mes de diferencia. Luego inyecciones de mantenimiento cada dos meses.



Antes de recibir la primera inyección de Apretude, el proveedor de salud puede pedirle que tome una tableta de Cabotegravir oral una vez al día durante un mes (al menos 28 días) para evaluar su tolerancia al medicamento. Usted recibirá la primera inyección el mismo día o dentro de tres días después de terminar de tomar las tabletas de Cabotegravir.



*Dada la demora que experimentan muchas personas para obtener la primera inyección, el proveedor de salud también puede considerar un inicio rápido de PrEP oral de Truvada genérico o de marca (TDF-FTC) o Descovy (TDF-TAF) para cualquier paciente que solicite dicha protección.

VENTANA DE DOSIFICACION

Es importante cumplir con las inyecciones programadas. Las inyecciones pueden administrarse siete días antes o después de la fecha de su cita. Si no puede asistir o pierde su cita, comuníquese con Howard Brown Health al 773.388.1600 lo antes posible para programar una cita nueva.



¿QUÉ HACER SI NO PUEDE ATENDER A SU CITA?

Si pierde su cita de inyección o va a faltar a una cita programada por más de 7 días, informe inmediatamente a su proveedor médico para recibir instrucciones sobre cómo continuar con su prevención de VIH y programar una nueva cita. Durante este tiempo puede tomar PrEP oral para conservar su protección hasta que pueda recibir su próxima inyección.

¿CUALES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE APRETUDE?

Los posibles efectos secundarios en el lugar de la inyección incluyen:

- Dolor, sensibilidad, hinchazón, moretones, enrojecimiento, picazón, pérdida de sensibilidad, y una masa o bulto endurecido*

Otros efectos secundarios comunes incluyen:

- Náusea
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Diarrea
- Fiebre
- Dolor de estómago
- Mareo

EFECTOS SECUNDARIOS POCO FRECUENTES

- Reacciones alérgicas
- Problemas hepáticos
- Depresión o trastornos de estado de ánimo

Estos solo son algunos de los efectos secundarios de Apretude. Consulte a su proveedor de salud para obtener asesoramiento médico.

**Utilizar una compresa tibia o una almohadilla térmica en el lugar de inyección durante 15 a 20 minutos después de la inyección y/o tomar analgésicos sin requisito de receta un poco antes o después de la inyección pueden proporcionar cierto alivio. Se ha demostrado que las reacciones en la zona de la inyección disminuyen a medida que se reciben más inyecciones.*

¿QUÉ HACER SI DECIDE DEJAR DE RECIBIR APRETUDE?

Es importante programar una cita con un proveedor médico si decide dejar de recibir Apretude para hablar acerca de otras opciones para reducir el riesgo de contraer VIH.

Apretude es un medicamento de liberación prolongada y puede permanecer en su organismo por 12 meses o más después de la última inyección. El nivel de medicamento en el organismo durante este periodo de tiempo es demasiado bajo para proporcionar protección u ocasionar efectos secundarios, pero si contrae VIH durante este período, puede desarrollar resistencia al tratamiento de VIH (lo que implica menos opciones de tratamiento).

Se recomienda usar otras opciones de prevención de VIH, como el PrEP oral diario, PrEP a demanda (2-1-1) u otros métodos de prevención del VIH durante este tiempo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede recibir Apretude?

- Apretude es elegible para cualquiera persona que quiera reducir el riesgo de contraer VIH a través de relaciones sexuales. Ha sido aprobado por la FDA para personas que pesen más de 77 lbs, incluidos hombres y mujeres cisgénero, hombres y mujeres transgénero e individuos de generos diversos.

¿Pueden las personas embarazades o en período de lactancia recibir Apretude?

- Actualmente no se recomienda ya que no se ha estudiado en estas poblaciones, sin embargo, en el estudio de extensión de HPTN 084 (OLE) se evaluará la seguridad y los resultados pediátricos entre les participantes embarazades.

¿Se recomienda el Apretude para las personas que se inyectan drogas?

- Aun no hay datos disponibles para respaldar el uso de Apretude en aquellos que se inyectan drogas.

**Consulte a su proveedor médico para información actualizada.*

¿QUÉ ES APRETUDE?

Apretude es un medicamento inyectable de acción prolongada que se utiliza para profilaxis de preexposición (PrEP) para reducir en gran medida el riesgo de contraer el VIH. Se administra cada dos meses, y ha demostrado mayor eficacia que los medicamentos de PrEP orales.

¿QUIEN DEBERÍA CONSIDERAR APRETUDE EN COMPARACIÓN DE OTRAS OPCIONES DE PREP?

Apretude puede ser la alternativa ideal para usted si ya está tomando PrEP oral y tiene:

- Dificultad con los regímenes tradicionales de píldoras diarias
- Dificultad para tragar pastillas
- Efectos secundarios adversos persistentes con el PrEP oral

¿CUAL ES EL COSTO DE APRETUDE?

El costo y cobertura puede variar según cada plan de seguro médico. Existen programas de ayuda financiera para personas con y sin seguro médico que pueden reducir o cubrir el costo total del medicamento. El equipo de PrEP brinda asistencia para confirmar el costo del medicamento y analizar las opciones de asistencia financieras disponibles.

Si le interesa comenzar con el PrEP inyectable o le gustaría obtener más información, llame a Howard Brown Health al **773.388.1600** o envíe un correo electrónico al equipo de PrEP a prep@howardbrown.org para programar una cita.

Atendemos a todas las personas sin importar su capacidad de pago. Si usted no tiene seguro médico, le ayudaremos a determinar si es elegible para obtener un seguro. Si no es elegible para obtener un seguro, nuestra escala de tarifas variables puede proporcionar servicios con descuento basado en sus ingresos.